



dierenkliniek : Kenaupark

Kenaupark 13, 2011 MP Haarlem
tel. 023-5310880
www.dierenkliniekkenaupark.nl

Openingstijden:
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
behandeling uitsluitend volgens afspraak

Nieuwsbrief 2
3e jaargang
April 2012

Verder in deze nieuwsbrief:

Paracetamol giftig voor katten

Behandeling schildklier
problemen bij de kat

Week van het kitten 2012

Laag, laag, laag !

Even voorstellen ...

Konijnen vaccineren

Wist u dat ...

Een nieuwe huisgenoot

Twee weken geleden werden wij op donderdag middag gebeld door een meisje die in een lege afvalcontainer in een café een muis had gevonden die daar waarschijnlijk ingevallen was op zoek naar eten.

Volgens haar zeggen was het café 3 dagen gesloten geweest, dus mogelijk had de muis al een paar dagen niet gegeten of gedronken. Wij adviseerden haar de muis in een doosje te doen met wat eten en wat drinken.

Ze vertelde dat ze van haar werkgever de muis niet mocht houden en dat hij weg moest. Mijn assistente bood aan om de muis bij ons in de kliniek op te nemen. Na een kwartier arriveerde het meisje met de muis. Ze hadden inmiddels een hechte band gekregen en de muis ging verder door het leven als Kwiedie.

Kwiedie was er niet al te best aan toe. Zijn vacht was verfromfaaid en zijn oogjes waren dof. Het meisje zou de volgende dag even bellen hoe het met hem ging.

Ik gaf aan dat als Kwiedie de nacht zou overleven en het weer goed maakte ik hem dan bij ons in de tuin zou loslaten. Kwiedie ging de couveuse in en kreeg verschillende lekkernijen om aan te sterken. 's Avonds ben ik nog even bij hem gaan kijken en zag tot mijn grote opluchting dat het wat beter met hem ging. Hij had van zijn stukje kaas gegeten en hij had geplast.

De volgende ochtend zag ik tot mijn schrik dat de couveuse leeg was. De deurtjes zaten nog goed dicht. Toen ik uiteindelijk de volledige couveuse gedemonteerd had trof ik Kwiedie aan tussen de kabeltjes in het diepste van het apparaat. Hij is daar waarschijnlijk via de ventilator ingekropen in een poging te ontsnappen. We keken elkaar aan en tegelijkertijd nam Kwiedie een sprong en rende over de vloer weg.

Ik was vast van plan om hem te vangen en uiteindelijk lukte mij dit na een half uurtje ook. Samen met mijn dochtertje hebben we hem buiten vrijgelaten. ▶



Indien u vragen en of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar:
nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl

-vervolg- Een nieuwe huisgenoot

Gisteravond kwam er via het beluchtingsroostertje van de gashaard een muis de woonkamer binnenrennen. Ik herkende hem direct. Het was Kwiedie.

Vanaf nu mag hij bij ons blijven en ik zal geen jacht meer op hem maken. Wel heb ik de 1-zijdige afspraak dat hij geen andere muizen mag meenemen.

Drs. J.W. Baljet



Paracetamol giftig voor katten!

Paracetamol is een veelgebruikte pijnstiller bij mensen. Het is bij mensen een veilig middel, maar kan bij dieren tot vergiftiging leiden.

Paracetamol is vooral giftig voor katten. Het kan bij katten leiden tot ernstige bloedarmoede en leverfalen. Het binnenkrijgen van 1 tablet paracetamol (500 mg) is al dodelijk voor een kat.

Wat zijn de verschijnselen?

De eerste verschijnselen worden meestal al binnen 4 uur waargenomen. De meest voorkomende verschijnselen zijn: snelle ademhaling en benauwdheid, depressie, braken, niet willen eten, zwellingen van hoofd en poten. Na 2 tot 7 dagen kunnen er problemen optreden door leverschade en in sommige gevallen nierschade. Over het algemeen sterven de dieren 2 tot 6 dagen na het binnenkrijgen van de paracetamol.

Wanneer moet er ingegrepen worden als uw dier paracetamol binnen heeft gekregen?

Bij katten moet altijd ingegrepen worden aangezien de opname van 1 tablet eigenlijk altijd al dodelijk kan zijn als er geen behandeling ingesteld wordt.



Wat is de behandeling?

Als het minder dan 2 uur geleden is dat uw dier paracetamol binnen gekregen heeft is het belangrijk om het dier te laten braken of de maag te laten spoelen. Neem direct contact op met de praktijk zodat een braakmiddel toegediend kan worden. Als het al langer dan 2 uur geleden is of als uw kat al vergiftigingsverschijnselen heeft is het verstandig om direct contact met de ons op te nemen.

Behandeling schildklier problemen bij de kat

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat hyperthyreoïdie een te snel werkende schildklier is, wat vaak veroorzaakt wordt door een goedaardige tumor.

De 3 verschillende therapie opties:

1. Medicamenteuze behandeling

We kunnen het schildklierhormoon remmen door middel van medicijnen welke levenslang dagelijks ingegeven moeten worden. Het is geen kuur, dus als een dag gemist wordt is het niet heel erg. Dan wordt alleen die dag het hormoon niet geremd en is de stofwisseling weer tijdelijk verhoogd. De dosering van het medicijn wordt in de loop van enkele weken opgebouwd, afhankelijk van het gemeten schildklierhormoon en de eventuele aanwezige complicaties. Medicamenteuze behandeling geeft geen permanente genezing, omdat je alleen het hormoon remt.

2. Chirurgische behandeling

De aangetaste schildklier kan operatief verwijderd worden. Het komt in 70% van de gevallen voor dat beide schildklierlobben overproduceren. Deze moeten dan ook beide verwijderd worden.

Heel dicht op beide schildklierlobben ligt een ander zeer klein orgaan, de bijschildklier, deze is enkele millimeters groot. De bijschildklier heeft een belangrijke functie in de calcium huishouding. Bij een operatie kan de bijschildklier beschadigd of verwijderd worden, waardoor de hormoonproductie wegvalt van de bijschildklier. Dit is zeker bij beiderzijdse verwijdering een risico. Dit tekort aan bijschildklierhormoon moet dan ondervangen worden middels medicijnen. De operatie zelf is dus geen grote ingreep, maar wel een precisie werk. Tijdens de operatie vormt de narcose het grootste risico.

Het kan ook gebeuren dat er een stukje schildklier gaat zwerven door het lichaam, de ectopische schildklier. Het vervelende is dat de ectopische schildklier ook overproductief kan zijn. Het is dan ook noodzakelijk dat duidelijk is waar alle overproductieve schildklierlobben liggen voordat tot operatie wordt overgegaan. De enige manier om dit in beeld te brengen is door middel van een scan bij een specialistische kliniek. Hierbij worden alle deeltjes van de hyperactieve schildklier in beeld gebracht, zodat zeker is dat bij operatie alles verwijderd wordt.

3. Behandeling met radioactieve Jodium isotopen

Hierbij worden radioactieve isotopen intraveneus bij uw kat ingespoten, deze isotopen vernietigen het hyperactieve schildklierweefsel zeer selectief, het gezonde schildklierweefsel wordt niet vernietigd. Het geeft een goed resultaat bij ongeveer 95% van de zieke katten.

Het voordeel is dat na deze ingreep de kat genezen is en geen medicijnen meer nodig heeft. Ook hoeft er geen narcose gegeven te worden en geen scan gemaakt te worden en er is geen risico op beschadiging van de bijschildklieren.

Het nadeel van deze ingreep is dat doordat er gebruik wordt gemaakt van een radioactieve stof, de kat een week intern moet worden opgenomen in een kliniek met een speciaal geïsoleerde ruimte.

Welke behandeling kiezen we?

De keuze is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de leeftijd van de kat, het gemak waarmee tabletten gegeven kunnen worden, de algehele conditie van de kat, de nierfunctie en natuurlijk ook de financiële mogelijkheden.



Week van het kitten 2012

Sophia KattenBond brengt probleemgedrag in beeld.

De Week van het Kitten vindt dit jaar plaats van 23 tot en met 29 april. De Sophia KattenBond vraagt dan aandacht voor de talloze katjes die te vroeg het nest verlaten. Dit kan ernstige gedragsproblemen tot gevolg hebben op latere leeftijd. Voorbeelden zijn bijten, in huis plassen, spullen kapot maken en angstigheid. De Sophia KattenBond roept kattenbezitters op om een filmpje te maken van dergelijk probleemgedrag en op te sturen naar kattenbond@sophia-vereeniging.nl. Daarmee kan zij potentiële eigenaren waarschuwen en veel kattenleed voorkomen.

Zelfstandig

Veel mensen bieden kittens aan die amper 8 weken oud zijn, vooral via het internet. De wettelijke leeftijd is 7 weken en hoe jonger, hoe groter de kans dat de diertjes verkocht worden. Maar liefst 98% van de huis-, tuin- en keukenkittens die worden aangeboden via Marktplaats.nl verlaat het nest jonger dan 12 weken. Maar ook al kan zo'n jong katje al harde brokjes eten en zelf de kattenbak vinden, het is nog lang niet zelfstandig. Wanneer het de broodnodige moederzorg mist, heeft dat ernstige gevolgen voor zijn gedrag op latere leeftijd.

Sociale ontwikkeling

Spelen met nestzusjes en -broertjes is belangrijk voor de sociale ontwikkeling van kittens. Ze leren waar hun grenzen liggen en dat hard bijten of krabben pijn doet. Moederpoes heeft in deze ontwikkeling ook een belangrijke rol. Zij corrigeert haar jongen als ze over de schreef gaan. Wanneer een kitten deze fase mist, kan later probleemgedrag ontstaan zoals hinderlijk miauwen, spullen kapot maken en onzindelijkheid. Bovendien heeft de kat niet geleerd wanneer de grens bereikt is, wat een normale omgang met mensen en andere katten moeilijk maakt.

Week van het Kitten

Gedragsproblemen als gevolg van een te korte nesttijd leiden er maar al te vaak toe dat de eigenaar besluit afstand te doen van zijn 'lastige' kat. Daarom lanceerde de Sophia KattenBond in 2009 de Week van het Kitten. In deze jaarlijkse voorlichtingscampagne wordt geadviseerd om kittens minstens 12 weken bij de moederpoes te houden. Op Marktplaats.nl worden banners geplaatst met het motto: 'Een schatje van een katje... maar de kater komt later!'. Daarmee worden kopers gewaarschuwd voor de risico's op de langere termijn. Mensen die te jonge kittens aanbieden, ontvangen een e-mail waarin verzocht wordt de dieren langer in het nest te laten.

YouTube

Speciaal voor de Week van het Kitten is de Sophia KattenBond op zoek naar beeldmateriaal waarop probleemgedrag te zien is van katten die te jong bij de moederpoes zijn weggehaald. Door het visueel te maken, kan zij potentiële eigenaren nog effectiever waarschuwen voor de gevolgen van een te korte nesttijd. Daarom roept de Sophia KattenBond katteneigenaren op om probleemgedrag vast te leggen en een filmpje (met een korte toelichting) op te sturen naar kattenbond@sophia-vereeniging.nl. Het filmpje mag maximaal 2 minuten duren en zal vanaf 23 april te zien zijn op YouTube.com. Inzenders maken kans op een gratis consult van kattengedragsdeskundige Marcellina Stolting.



Klik op <http://www.sophia-vereeniging.nl/nl/pages/huisdier-en-welzijn/katten/kitten-kopen.html> voor meer informatie over het kopen van een kitten.

Laag, laag, laag!

Als een hond tegen iemand opspringt is dit niet altijd even leuk. U heeft uw mooie witte broek aan en de hond is net in de vijver gesprongen. Terecht dat u dan kwaad wordt, alleen vergeten we vaak dat we het de honden zelf hebben aangeleerd.

Als de hond nog een pupje is, vinden we het meestal goed dat hij tegen ons opspringt, eigenlijk vinden we het nog leuk ook en we belonen de pup dan ook uitbundig door hem te aaien en te kroelen als hij tegen ons opstaat. Helaas vergeten we op dat moment dat de pup, hoe klein dan ook al aan het leren is. Hij leert dat tegen de baas opspringen ontzettend leuk is.

Laag, laag, laag!

Als de hond echter wat groter wordt, vinden we het niet meer zo leuk en zeker niet als de hond tegen een kind opspringt wat vervolgens omvalt, dan worden we boos. De hond begrijpt hier natuurlijk helemaal niets van. Eerst mocht het en werd hij beloond en nu krijgt hij opeens op zijn donder. We roepen dan ook uitbundig "laag, laag, laag"!

Fouten die we maken.

De eerste fout die we maken is dat we het goed vinden als het pupje tegen ons opspringt. U zult vanaf het moment dat de pup bij u is een regel moeten maken die voor iedereen geldt.

Als de pup tegen iemand opspringt geven we de pup geen enkele aandacht. We kijken niet, we zeggen niets, we raken de pup niet aan. Het enige wat we doen is een stapje achteruit zodat de hond weer met zijn vier pootjes op de grond komt. Staat hij met vier pootjes op de grond, dan krijgt hij weer aandacht. Springt hij weer, dan hop weer een stapje achteruit. U zult merken, dat als u dit allemaal doet, ook mensen die u op straat tegen komt, dat de pup heel snel weet dat dit gedrag hem niets oplevert. Het op vier pootjes staan levert hem wel iets op, dan krijgt hij de aandacht die hij zo graag wil.

De tweede fout die we maken is dat als de hond tegen ons opstaat wij 'laag, laag, laag!' roepen. Honden leren door middel van associaties te leggen. U roept laag, terwijl de hond tegen u opspringt, de hond leert dus dat hoog laag is.

Zeg dus pas laag als de hond met vier voetjes op de grond staat.

Het is belangrijk dat iedereen hier aan mee doet. Als de hond van de ene wel op mag springen en van de andere niet, dan heeft het geen zijn. Trek hierin een lijn.

Marie Louise Hebly, hondengedragdeskundige.



Even voorstellen ...

Al sinds ik mij kan herinneren ben ik omringd met dieren. Van de hond in zijn mand en de katten op de trap tot de kippen in de tuin, er waren altijd overal dieren. Erg trots was ik dan ook toen ik op mijn vijfde een eigen cavia kreeg genaamd Lady (naar Lady en de Vagebont). Ergens in die periode ontstond het idee om dierenarts te worden en dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. Toen ik op mijn elfde paard ging rijden en dagen lang op de manege rond hing en daarna op de ruiterkampen rijles gaf, wilde ik perse paarden dierenarts worden en paarden hebben dan ook nog steeds mijn interesse.

Na een lange aanloop via mavo, havo en vwo mocht ik dan eindelijk in Utrecht Diergeneeskunde gaan studeren. Heel lang was het idee om zowel de paarden als de gezelschapsdieren te gaan behandelen maar omdat ik dingen niet half wilde doen heb ik moeten kiezen en uiteindelijk werden het de gezelschapsdieren, terug naar mijn oude liefde: knaagdieren.

Eind 2007 ben ik afgestudeerd en ben ik eerst voor een vakantie waarneming aan de slag gegaan in een moderne praktijk in Oosterblokker, waarna ik direct aan de slag kon in een kliniek in Almere. Beide waren praktijken waar alleen gezelschapsdieren worden behandeld en een gemengde praktijk leek me ook wel leuk dus op naar Noord-Scharwoude voor een jaar. Na nog wat omzwervingen ben ik vorig jaar zomer in Haarlem komen werken en toen wilde ik eigenlijk niet meer weg. Gelukkig mocht ik terug komen om Hilje Sijperda tijdens haar zwangerschapsverlof te vervangen en als ze weer terug is ga ik vast op de vrijdag werken en daarnaast in de vakanties.

Mijn vrije tijd vul ik met zorgen voor en spelen met mijn dochter van bijna 15 maanden, mijn vriend, dansen, fietsen, lezen, fantasyfilms kijken en in de zomer varen. En mocht je afvragen hoe zit het nu met die knaagdieren?? We hebben nu vier!! katten en ik kan niet wachten tot Elena oud genoeg is want dan komt die cavia er, zeker weten!!

Debbie de Vries



Konijnen vaccineren

In Nederland komen regelmatig uitbraken voor van twee zeer besmettelijke en gevaarlijke konijnenvirussen:

Myxomatose (konijnenziekte)

Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus (Myxomavirus, een virus behorend tot de pokkenvirussen). Myxomatose wordt met name verspreid door stekende insecten zoals vlooien, muggen en vliegen. Ook is besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen mogelijk.

De symptomen:

De tijd tussen besmetting en de eerste symptomen (=incubatietijd) is enkele dagen tot 2 weken. De kenmerken van deze ziekte zijn: zwellingen van de oogleden, mond, neus, oren, poten, anus en geslachtsorganen. Doordat de oogleden erg gezwollen raken kan het konijn niet meer zien en wordt als het ware blind, (wilde) konijnen vormen zo een gemakkelijke prooi voor roofdieren. Er kunnen knobbels ontstaan in de huid (myxomen), voornamelijk op de oren, rond de mond en op de rug. Na enkele dagen ontstaat er vaak een longontsteking waaraan het konijn zal overlijden. De ziekte komt vooral tijdens de zomer en vroege herfst voor.

VHD (Viral Haemorrhagic Disease)

VHD is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een calicivirus. Het virus is afkomstig uit China en komt sinds 1993 in Nederland voor en tast voornamelijk de lever aan. Deze virusziekte wordt overgebracht via direct contact met andere konijnen, via mest of besmet materiaal (zoals kooien en drinkflesjes), door het eten van besmette groenten (vers geplukt gras) en via stekende insecten. Ook kan je het virus zelf overdragen via je kleding of schoenen. Het is aangetoond dat het virus wel tot 3 maanden op kleding kan overleven!

De symptomen:

Na een incubatietijd van 16 uur tot 3 dagen kunnen de eerste symptomen optreden. De kenmerken van deze ziekte zijn: verminderde eetlust, benauwdheid en hoge koorts binnen 48 uur. In sommige gevallen kunnen zich hersenverschijnselen en krampen voordoen. In het laatste stadium van de ziekte zie je vaak schuimige bloederige neusuitvoeiing. Meestal sterft het konijn snel aan bloedingen in het lichaam. Deze bloedingen treden met name op in de darmen. Het zijn deze bloeding waaraan de ziekte zijn naam heeft te danken: "hemorrhagisch" betekent "bloed". De ziekte gaat echter niet altijd gepaard met bloedingen. Er is ook een vorm waarbij het konijn plots dood neervalt zonder eerst andere symptomen te hebben vertoond.

Preventie:

Aangezien aangetaste dieren in veel gevallen zullen overlijden, is het zinvol om tegen beide virusinfecties preventief te vaccineren. De enting geeft 1jaar bescherming tegen deze ziektes. Muggen en insecten komen ook binnenshuis voor, dus ook binnenkonijnen lopen risico op deze ziektes. Dus ook voor binnenkonijnen is het advies om te enten.

Hygiëne

Het weren van muggen door het gebruik van horren of fijnmazig gaas en een goede verzorging zijn andere preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes. Het regelmatig opruimen van de ontlasting en urine van de konijnen zal voorkomen dat stekende insecten daar hun eitjes gaan leggen en zo een plaag kunnen worden.



-vervolg- Konijnen vaccineren

Konijnen ent-spreekuur:

Voorheen hadden we entstoffen die alleen geleverd konden worden in flesjes van 10 vaccins. Waardoor we alle konijnen uitnodigden op een speciaal konijnen-entspreekuur.

Inmiddels hebben we een nieuw vaccin, dat per flacon gebruikt kan worden en 1 jaar bescherming geeft in plaats van 6 maanden. Dit geeft de mogelijkheid om op alle werkdagen een afspraak te maken.

Kosten

De kosten voor de vaccinatie zijn €32.50 en elk volgend konijn €25,-

Wist u dat ...

Verhuisdieren.nl, matcht huisdieren die herplaatst moeten worden, met mensen die een huisdier zoeken.

Kijk voor meer informatie op www.verhuisdieren.nl



Hilje Sijperda bevallen is van een dochter, Margaux.

Moeder en dochter maken het goed.

Alle lelies van de familie met de latijnse namen Liliaceae en Hemerocallis voor katten zeer giftig zijn! Alle plantendelen: bladeren, bloemen, meeldraden en stampers bevatten de giftige stoffen. De bloemen zijn het meest giftig. Laat uw kat ook niet van het water drinken waar de lelies in staan.

