



dierenkliniek : Kenaupark

Kenaupark 13, 2011 MP Haarlem
tel. 023-5310880
www.dierenkliniekkenaupark.nl

Openingstijden:
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
behandeling uitsluitend volgens afspraak

Nieuwsbrief 12
2e jaargang
Februari 2012

Seksuele voorlichting

Verder in deze nieuwsbrief:

Toxoplasmose

Hoe geeft u uw kat een tablet

Ondergronds kattenspel

Weet wat u beloont

En deze maand ...

Haarballen bij het konijn

Wist u dat ...

Wat kunt u in de volgende
nieuwsbrief verwachten?

Laatst werd mij gevraagd op het telefonische spreekuur of wij ook aan KI deden bij honden. Het ging om een reu die wel begreep dat er iets van hem verwacht werd, maar wat precies en vooral hoe, ging aan hem voorbij. De beller beschreef dat hij continu op de kop van het teefje zat te rijden.

Het doen van KI bij honden heb ik voor het eerst gezien toen mijn vader mij vroeg om hem te helpen. Ik zal zo'n 10 jaar geweest zijn toen er 2 hondjes waren, waarvan het teefje niet zwanger werd. Nou, dat helpen leek me natuurlijk wel leuk.

In de praktijk waren er 2 Engelse Bulldoggen. Mijn vader vroeg mij om het teefje vast te houden en legde mij uit dat hij ervoor zou zorgen om het zaad van het reutje op te vangen.

De reu vond de teef erg leuk, maar was te lui om te dekken. Mijn vader legde uit dat de reu wel de teef mocht ruiken, maar niet mocht bespringen. Mijn taak was het om de achterkant van de teef naar de neus van de reu toe te keren. Met een handschoen aan greep mijn vader de penis van de reu terwijl de reu dekbewegingen ging maken. Een paar tellen later ving hij het zaad van de reu op in een petrischaaltje. We gaan nu kijken of het sperma van goede kwaliteit is, zei hij.

Met een rood hoofd van alles wat ik nu weer had gezien liep ik achter hem aan naar de microscoop. Het is belangrijk, zei hij, om het zaad op lichaamstemperatuur te houden. Onder de microscoop zag ik allemaal kleine visjes. Die met die scheve staartjes zijn niet goed en ook die met twee staartjes redden het niet om bij het eitje te komen.

Om de zwemsnelheid te testen deed hij aan 1 kant van het objectglasje een druppeltje citroenzuur. Direct zwommen de zaadcellen om het hardst ernaar toe. ▶



Indien u vragen en of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar:
nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl

Mooi zei mijn vader. Het sperma is van voldoende kwaliteit en nu gaan we het in het teefje stoppen.

Ik moest het teefje met haar achterkant omhoog houden zodat hij het sperma met een pipet makkelijk in de vagina van de teef kon stoppen. Nu moet je een kwartier zo blijven zitten, zei hij, want door de zwaartekracht loopt het dan verder de baarmoeder in. Dat kwartier duurde erg lang. Ik had het gevoel dat ik even rust en verse lucht nodig had om dit alles weer te verwerken.

De eigenaar die op het telefonische spreekuur belde heb ik trouwens geadviseerd om de reu met zijn neus onder de staart van de teef te duwen. Hij begreep de hint en 60 dagen later werden de puppy's geboren.

Toen ik laatst aan mijn dochter Kiki (zes jaar) vroeg waar baby's vandaan kwamen begon ze mij het hele verhaal te vertellen over het eitje in de buik van de moeder en het zaadje van de vader. Als die samenkwamen werd het een baby'tje. Vol verbazing hoorde ik dit allemaal aan.

Uit angst voor het antwoord heb ik haar niet durven vragen waar die zaadjes dan vandaan komen.

Drs J.W. Baljet



Toxoplasmose

Toxoplasma gondii is een eencellige parasiet die bij alle diersoorten kan voorkomen. Alleen in de kat en katachtigen kan de toxoplasma zich verder ontwikkelen tot in het volwassen stadium. Dit betekent dat alleen katachtige de eieren kunnen uitscheiden. De eieren worden uitgescheiden via de ontlasting en kunnen zo andere dieren besmetten. Het grootste gevaar van toxoplasma is dat mensen zich makkelijk kunnen infecteren met de eitjes die zich kunnen bevinden in besmette tuinaarde, de kattenbak en in rauw vlees.

Wat voor een gevolgen heeft een toxoplasma infectie voor mijn kat?


De meeste katten die geïnfecteerd zijn met de toxoplasma parasiet vertonen geen symptomen. Soms zien we diarree of zachte ontlasting. Als een kat algehele toxoplasmose ontwikkeld, kunnen zijn darmen, lever, longen en het zenuwstelsel aangetast worden. Soms ontwikkelen katten oogafwijkingen.

Hoe kan ik toxoplasma infecties bij mijn kat voorkomen?

De belangrijkste maatregel is het veelvuldig verwijderen van de ontlasting op die plekken waar uw kat zijn behoefte doet en elke dag de ontlasting uit de kattenbak te verwijderen. Draag wel handschoenen en was uw handen in verband met mogelijke infecties van uzelf.

Is Toxoplasma gondii gevaarlijk voor de mens?

Mensen kunnen zich makkelijk infecteren met Toxoplasma gondii, en dan ernstig ziek worden. Ongeveer de helft van de Nederlanders is ooit geïnfecteerd geweest met de toxoplasma parasiet. Na infectie, die meestal griepachtige verschijnselen geeft, blijft de parasiet als cyste achter in verschillende organen van het lichaam. Dit geeft geen problemen zolang de afweer goed functioneert. Bij mensen met een verminderde of gestoorde afweer, zoals bij HIV-geïnfecteerden het geval is, kan deze parasiet echter wel problemen geven, doordat de parasiet zich gaat vermeerderen.



Zwangerschap

Een toxoplasmose infectie kan gevolgen hebben voor de ontwikkelende baby. Als de moeder zich gedurende de zwangerschap infecteert kan toxoplasmose in de baby of op latere leeftijd ziekteverschijnselen geven.

Wat u moet onthouden over toxoplasmose?

- Toxoplasma infecties kunnen zeer gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen en voor mensen met een verlaagde weerstand;
- Katten met toxoplasmose hebben meestal geen ziektesymptomen. Soms zien we diarree of zachte ontlasting;
- Heel soms kunnen katten zeer ziek worden van toxoplasma infecties;
- Houdt de omgeving en de kattenbak vrij van ontlasting(sresten), en laat uw kat geen prooidieren opeten.
- Was uw handen of draag handschoenen tijdens het tuinieren.

Bron:
www.wormbestrijding.nl

Hoe geeft u uw kat een tablet in?

Zet uw kat op tafel of op de grond tussen uw benen. De handigste houding is als de kat zit (zoals een hond). Pak de kat over de kop vast met uw wijsvinger en duim aan beide zijden van de kop en oefen voorzichtig wat druk uit op de boven kaken terwijl u de pil in de andere hand gereed houdt. Laat de kat goed omhoog kijken. De meeste katten openen dan vaak al een beetje de bek. Probeer met 1 vinger de onderkaak wat naar beneden te duwen. Zodra uw kat zijn bek opent werkt u de pil naar binnen en geeft u de kat de gelegenheid om te slikken. Wrijf wat over de keel om het slikken te bevorderen. Het is belangrijk dat de pil zo ver mogelijk achter in de keel/bek komt. De kat kan deze er dan moeilijk uitwerken met zijn tong en zal minder gaan speekselen. Als uw kat met zijn poten uw armen wegduwt of open krabt is het verstandig om het geven van een tablet met zijn tweeën te doen. De één houdt dan de kat vast inclusief de voorpoten en de andere persoon pakt de kop en probeert met de andere hand de pil naar binnen te krijgen.

Bent u alleen dan kan een handdoek uitkomst bieden. Wikkel de kat in een handdoek zodat de voor- en de achterpoten bedekt zijn. Ga op uw knieën zitten met de kat tussen uw benen. Pak met 1 hand de kop vast zoals hierboven beschreven en met de andere hand geeft u de pil in.

Het gebruik van een pillenschietter



Een pillenschietter is een soort plastic spuitje met aan het eind een klein bekje waar u de pil tussen kunt klemmen. Het voordeel is dat u zelf niet met uw vingers in de bek van de kat hoeft te komen. U houdt de kat weer vast zoals hierboven beschreven en met de pillenschietter gaat u tussen de lippen en de kaak van de kat door en schiet dan de pil zo ver mogelijk achter in de bak.

U kunt in de pillenschietter ook wat water doen en deze tegelijkertijd met de pil naar binnen schieten, de kat zal dan zeker slikken.

Easypil

Easypil is een kneedbaar smakelijk deeg waar u een pil in kunt verstoppen. U kneedt het deeg om de pil heen en de meeste katten eten dit zo op. Er kunnen uit 1 easypil ongeveer 8 tot 10 balletjes gemaakt worden afhankelijk van de grootte van de tablet.

Drankje

Eventueel kunnen we ook een drankje maken wat bij sommige katten makkelijker is om in te geven. Het voordeel is dat u het tuitje van het spuitje aan de zijkant van de bek naar binnen kunt steken en dan de vloeistof naar binnen kunt spuiten. Het nadeel is dat medicatie vaak heel vies smaakt en dat katten hier enorm van gaan speekselen, ook slikken ze niet altijd alles door.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Penny Kieft, kattengedragdeskundige.

Ondergronds kattenspel

Katten zijn geboren grotonderzoekers. In een speeltunnel kunnen ze die hartstocht het beste botvieren. Ook hiervoor heeft de dierenspecialzaak prachtige meubels in allerlei grootten, vormen, kleuren en materialen.

Doe-het-zelftip: Een langwerpige doos (bijvoorbeeld de verpakking van planken) wordt een geweldig speelhol. Plak hiervoor de doos weer zorgvuldig dicht en snijd een paar ronde gaten in de zijkant. Dit zijn de ingangen. Veel katten vinden het fijn als de doorgang slechts zo groot is dat ze zich er met moeite doorheen kunnen wurmen. Vul de doos voor de helft met ritselend papier.

Wat getraind wordt: Tastzin en gehoor.

Weet wat u beloont

Dat belonen beter werkt als straffen weten we allemaal, maar toch gaan we nog vaak de mist in.

Wat is nu een beloning voor de hond?

Beloningen kunnen materieel zijn, te denken valt aan een koekje of een speeltje en bij deze beloningen gaat het meestal wel goed. De hond doet wat er van hem gevraagd wordt en u geeft hem een beloning.

Ook een aanmoediging of een aanraking kan voor de hond een beloning zijn.

Voor belonen geldt echter wel dat de hond het ook moet zien als een beloning. Zo ken ik een hond die het heel vervelend vindt om over zijn koppie te worden geaaid. Voor hem is die aai geen beloning, maar een correctie.

Waar gaat het nu mis met belonen?

We beseffen ons vaak niet dat we de hond belonen in plaats van te corrigeren.

Voor de duidelijkheid wat voorbeelden.

U bent met uw hond aan het wandelen en er komt een fietser aan. Uw hond gaat achter de fietser aan en op dat moment haalt u de bal uit uw zak en gooit hem weg in de hoop dat de hond achter de bal aangaat en niet achter de fietser aan blijft rennen. Uw hond heeft nu geleerd dat achter een fietser aanrennen betekent dat u met een balletje gaat spelen. U heeft dus het gedrag "achter de fietser aanrennen" beloont. De kans is aanwezig dat hij dit de volgende keer weer gaat doen, met nog meer enthousiasme. Hij weet namelijk dat er dan met hem gespeeld wordt.

We zijn geneigd om dingen met de hond te ruilen. De hond ligt aan uw antieke kastje te knagen. Uiteraard bent u hier niet van gediend en u haalt een knaagbotje uit de kast en geeft dit vervolgens aan uw hond. Uw hond heeft geen idee van de waarde van het antieke kastje en ziet het gewoon als een stuk hout waar je heerlijk op kunt knagen. Door het geven van dat botje leert uw hond dat als hij aan dat stuk hout gaat knabbelen hij van u een botje krijgt. De volgende keer als hij zin heeft in een botje zal hij dus zeker aan uw antieke kastje beginnen.

Ook negatieve aandacht kan een hond als positief ervaren. De hond springt bijvoorbeeld steeds tegen u op. Hij vraagt om aandacht. Omdat de hond, als hij tegen u opspringt steeds wordt teruggeduwd, of tegen hem wordt gesproken heeft uw hond de aandacht die hij wil hebben en zal hij tegen u blijven opspringen.



-vervolg- Weet wat u beloont

U moet dus altijd goed kijken of u uw hond het als een beloning ervaart of als een correctie.

Negeren?

Er wordt regelmatig gezegd dat u de hond als hij iets verkeerd doet moet negeren. Nu is negeren niet altijd mogelijk. Het lijkt mij namelijk niet handig als u uw hond negeert als hij achter een fietser aangaat, of aan uw antieke kastje aan het knagen is.

Van belang is dat als u bepaald gedrag van uw hond als onplezierig ervaart, u er bij bent voor hij dat gedrag gaat inzetten. Dit houdt wel in dat u erg alert moet zijn in de aanleerfase.

U bent met uw hond aan het wandelen en u ziet een fietser aankomen. Voordat de hond zijn gedrag (achter de fietser aangaan) inzet, heeft u het balletje al in uw handen en gaat met de hond spelen. U moet op dat moment belangrijker zijn dan de fietser. Zo ook als uw hond naar dat antieke kastje wil gaan. Bij het opspringen kijkt u niet naar uw hond, u zegt niets en duwt hem ook niet van uw af. Het enige wat u doet is een stap naar achter zodat hij weer met zijn vier pootjes op de grond "valt". Zeg pas "laag" als hij op de grond staat.

Doet hij wat u wilt, dat kunt u hem belonen met iets lekkers, een speeltje of met uw stem. Doe dat wat uw hond als een beloning ervaart.

Mag u corrigeren?

Ja natuurlijk mag u corrigeren. Als een kind iets verkeerd doet, wordt hij ook gecorrigeerd. En net als bij kinderen slaan of schoppen we niet. Zoek naar een correctie die uw hond ook als een correctie ervaart, zonder hem daarbij pijn te doen.

Besef ook dat dingen niet zomaar zijn afgeleerd of aangeleerd. U moet veel geduld hebben en blijf naar uw hond kijken en zie daardoor wat hij als een beloning of correctie ervaart.

Marie Louise Hebly, hondengedragsdeskundige



Februari: Maand van het Gebit

- 4 van de 5 honden ouder dan 3 jaar hebben last van gebitsproblemen.
- 2 van de 3 katten ouder dan 3 jaar hebben last van gebitsproblemen.

Een verwaarloosd gebit kan ernstige gevolgen hebben, zoals het verlies van tanden of zelfs ontstekingen in belangrijke organen. Toch denkt het merendeel van de baasjes dat het gebit van hun dier gezond is. Ook dit jaar is februari uitgeroepen tot de “maand van het gebit”.

Honden en katten hebben vaker gebitsproblemen dan de meeste mensen denken. Gebitsproblemen worden met name veroorzaakt door tandplak, dat al na 24 uur wordt omgezet in tandsteen. De vorming van tandsteen kan ervoor zorgen dat je huisdier last van het gebit krijgt. Verwaarloosde gebitsproblemen kunnen vervolgens ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van uw hond of kat.

Kauwt uw hond of kat minder makkelijk op harde brokken? Stinkt hij uit de bek? Of wilt u gewoon zeker weten of alles in orde is?

In “de maand van het gebit” krijgt u:

- Een gratis gebitscontrole, u kunt bellen voor een afspraak
- 10% korting op gebitsverzorgingsproducten
- Korting op een zak Dental van Royal Canin
 - voor de hond onder 10 kg 1kg + 1kg gratis
 - voor de hond boven 10 kg, 3kg + 3kg gratis
 - voor de kat 1kg + 500gram gratis



Haarballen bij het konijn



Konijnen komen in principe in het begin van de lente in de rui, waarbij de wintervacht vervangen wordt door een zomervacht. Vooral bij konijnen die buiten gehouden worden, kan dit een duidelijk verschillende vacht zijn. De overtollige haren zal uw konijn zelf uit zijn vacht plukken en likken. Normaal gesproken kunnen enkele haren door de darmen verteerd worden en komen ze via de keutel naar buiten. Wanneer er zeer veel haren uit getrokken worden, dan kunnen de darmen dat niet aan en kan er een opstopping komen door deze haarbal. De medische term daarvoor is trichobezoar en kan levensbedreigend zijn. Er moet immers altijd passage van de darmen zijn. Uw konijn zal geen of veel minder keutels meer kunnen produceren en zal minder gaan eten omdat hij buikpijn heeft.

Therapie

Er moet dus ook direct met een behandeling tegen deze haarballen begonnen worden. Deze is zeer intensief en veeleisend, maar ook zeker noodzakelijk. Als uw konijn door de buikpijn zelf niet eet, moet u hem dagelijks dwangvoeren met bijvoorbeeld Critial Care®, totdat hij zelf weer eet. Na het

dwangvoeren is het verstandig om de buik te masseren zodat er weer ontlasting geproduceerd wordt. Uw konijn moet snel weer ontlasting produceren, anders moet u contact met ons opnemen. Ook als u nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wist u dat ...

Dierenarts Hilje Sijperda met zwangerschapsverlof is. Dierenarts Debbie de Vries neemt voor haar waar.

Een reuzenpanda per dag tot 30 kilo bamboe moet eten!



Wij op 31 januari van 19,00 uur tot 21,00 uur een puppyclinic organiseren. Voor puppy's van 8 tot 14 weken oud. Deze voorlichtingsavond wordt gegeven door onze hondengedragdeskundige Marie Louise Hebly. Zij bespreekt alles wat u moet weten over uw nieuwe pup. Deelname is gratis.

Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief verwachten?

Hyperthyreoïdie bij de kat
Wat is hyperthyreoïdie en hoe stellen we de diagnose?



Hoe goed ziet een vogel?

Ras van de maand de Maine Coon
Is het Main Coon of toch echt Maine Coon?

